

**Reizhusten****Globuli****Was ist ferner zu beachten?**

- Zuckerfrei. Mit Xylit.
  - Vor Kindern geschützt aufbewahren.
  - Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit <Exp.> bezeichneten Datum verwendet werden.
  - Bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern.
- Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

**Was ist in SIMILASAN Reizhusten enthalten?**

Globuli enthalten: Drosera D3 60 %, D6 20 %, D12 20 %. Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

**Zulassungsnummer:**

51340 (Swissmedic)

**Wo erhalten Sie SIMILASAN Reizhusten?****Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungsgrößen: 15 g

4,5 g (nur als Bestandteil der Reise- und der Taschen-Apotheke)

**Zulassungsinhaberin:**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

**Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäß Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den größten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

**Wann wird SIMILASAN Reizhusten angewendet?**

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Reizhusten angewendet werden bei:

- Trockenem Husten mit Schmerzen hinter dem Brustbein
- Reizhusten, Kitzelhusten mit Brechreiz
- Hustenanfällen (besonders nachts)

**Was sollte dazu beachtet werden?**

- Bei starkem Husten, der länger als 7 Tage anhält, muss ein(e) Arzt/Ärztin oder ein(e) Apotheker/in beigezogen werden.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Reizhusten gleichzeitig eingenommen werden darf.

**Wann darf SIMILASAN Reizhusten nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?**

- Husten bei Kindern unter 2 Jahren soll ärztlich abgeklärt werden. Deshalb soll das Präparat bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
  - an anderen Krankheiten leiden,
  - Allergien haben oder
  - andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen.

**Wie verwenden Sie SIMILASAN Reizhusten?**

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kleinkinder, Kinder und Erwachsene:

- 7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.
- Akute Beschwerden: Viertelständlich.
- Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- Zum Aushelfen: 3–6 mal täglich.

**Einnahmehinweise:**

- Globuli (Kügelchen) im Mund zergehen lassen.
- Dürfen auch auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

**Welche Nebenwirkungen kann SIMILASAN Reizhusten haben?**

Für SIMILASAN Reizhusten sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

**Massnahmen bei anfänglicher Symptomverstärkung:**

1. Präparat nicht mehr einnehmen bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal 7 Globuli (Kügelchen) einnehmen. Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen unter «Wie verwenden Sie ...» einhalten.

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Reizhusten ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

**Globules****A quoi faut-il encore faire attention ?**

- Sans sucre. Avec xylite.
  - Conserver hors de portée des enfants.
  - Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <Exp.> sur le récipient.
  - Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.
- Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

**Que contient SIMILASAN toux irritative ?**

Les globules contiennent : Drosera D3 60 %,

D6 20 %, D12 20 %.

La préparation contient en tant qu'excipients : xylite et carbonate de calcium.

**Numéro d'autorisation :**

51340 (Swissmedic)

**Où obtenez-vous SIMILASAN toux irritative ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements : 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

**Titulaire de l'autorisation :**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en février 2009.

**Médicament homéopathique****Similasan****Toux irritative****Information destinée aux patients**

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

**Quand SIMILASAN toux irritative est-il utilisé ?**

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN toux irritative peut être utilisé en cas de :

- Toux sèche avec douleur à l'arrière du sternum
- Toux irritative, toux avec chatouilllements et envie de vomir
- Quintes de toux (surtout la nuit)

**De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?**

- En cas de toux forte persistante plus de 7 jours, il faut consulter un médecin ou un pharmacien.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si SIMILASAN toux irritative peut être pris simultanément.

**Quand SIMILASAN toux irritative ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?**

- La toux de l'enfant de moins de 2 ans devrait faire l'objet d'une exploration médicale. Pour cette raison, la préparation ne devrait pas être administrée aux enfants de moins de 2 ans sans exploration médicale préalable.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

**Comment utiliser SIMILASAN toux irritative ?**

Sauf prescription contraire du médecin :

Bébés, enfants et adultes : 7 globules par prise.

- Troubles aigus : Tous les quarts d'heure. Réduire la fréquence au fur et à mesure de l'amélioration des troubles.
- Pour parachever la guérison : 3–6 fois par jour.

**Mode d'emploi :**

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

**Quels effets secondaires SIMILASAN toux irritative peut-il provoquer ?**

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN toux irritative.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

**Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :**

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre une fois 7 globules. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... ».

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN toux irritative et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

**Tosse irritativa****Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

**Quando si usa SIMILASAN tosse irritativa?**

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN tosse irritativa trova impiego nei casi di:

- Tosse stizzosa con dolori dietro lo sternio
- Tosse irritativa con conati di vomito
- Accessi di tosse (soprattutto di notte)

**Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

- Rivolgersi al medico o al farmacista se la tosse forte persiste per più di sette giorni.
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN tosse irritativa.

**Quando non si può assumere SIMILASAN tosse irritativa e quando la sua somministrazione richiede prudenza?**

- In presenza di tosse nei bambini al di sotto dei 2 anni, è opportuno che un medico ne accerti la causa. Perciò, si consiglia l'impiego di questo preparato nei bambini al di sotto dei 2 anni senza aver consultato un medico.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
  - soffre di altre malattie,
  - ha qualche allergia oppure,
  - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

**Come usare SIMILASAN tosse irritativa?**

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Neonati, bambini e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- Disturbi acuti: Ogni quarto d'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- Per la completa guarigione: 3-6 volte al giorno.

**Avvertenze per l'assunzione:**

- Lasciare sciogliere i globuli in bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

**Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN tosse irritativa?**

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN tosse irritativa. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

**Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:**

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare ...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN tosse irritativa e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

**Globuli****Di che altro occorre tener conto?**

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

**Cosa contiene SIMILASAN tosse irritativa?**

Globuli contingono: Drosera D3 60 %, D6 20 %, D12 20 %.

Il preparato contiene come excipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

**Numeri dell'omologazione:**

51340 (Swissmedic)

**Dove è ottenibile SIMILASAN tosse irritativa? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio e della farmacia tascabile)

**Titolare dell'autorizzazione:**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).

**Dry cough****Information for patients**

Read this package leaflet carefully since it contains important information. This medicine has either been prescribed for you personally by your doctor, or you have purchased it from a pharmacist or druggist without a medical prescription.

In order to obtain the greatest benefit from this medicine, use it according to this package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or druggist. Keep this package leaflet safe, you may want to read it again later.

**When should SIMILASAN dry cough be taken?**

In accordance with homeopathic principles, SIMILASAN dry cough can be taken in cases of:

- Dry cough with pain behind the breastbone
- Irritating or tickling cough accompanied by tendency to nausea
- Paroxysmal cough, particularly at night

**What precautions should be taken?**

- Should a bad cough persist for more than 7 days, a doctor or pharmacist must be consulted.

- If your physician has prescribed other medications, please ask him/her or your pharmacist if you may take SIMILASAN dry cough at the same time.

**When must SIMILASAN dry cough not be taken or taken only with caution?**

- Coughs in children under the age of 2 should be clinically investigated. For this reason the preparation should not be used in children under the age of 2 without a clinical investigation.

- Tell your doctor, pharmacist or druggist if you
  - are suffering from any other diseases or illnesses,
  - have allergies or
  - are taking other medicines (even those you have bought yourself).

**Globules****What should also be taken into consideration?**

- Sugar-free. With xylitol.
  - Keep out of the reach of children.
  - This preparation must not be used after the expiry date indicated as <Exp.> on the container.
  - Store at room temperature (15-25 °C).
- Further information can be obtained from your physician, pharmacist or druggist.

**What does SIMILASAN dry cough contain?**

The globules contain: Drosera D3 60 %, D6 20 %, D12 20 %.

The medication contains as excipients: xylitol and calcium carbonate.

**Product licence No.:**

51340 (Swissmedic)

**Where can you obtain SIMILASAN dry cough? How is the preparation presented?**

In pharmacies and drugstores, without medical prescription.

Package sizes: 15 g

4,5 g (only as part of the Travel Medical Kit and Pocket Medical Kit)

**Holder of the product licence:**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

The latest examination of this package leaflet was carried out in February 2009 by the Federal Authorities for Medication (Swissmedic).

**Measures to take in the case of initial worsening of symptoms:**

1. Stop taking the preparation until the reaction has ceased.
  2. Take a single dose of 7 globules and wait for reaction.
  3. If the reaction recurs, proceed as described in 1. and 2. above.
  4. If the reaction does not recur, follow the instructions mentioned in "How do you take ...".
- Should the worsening of symptoms persist, stop taking SIMILASAN dry cough and inform your physician, pharmacist or druggist.